

Cobb500™ vleeskuikenbedrijf **CONTROLELIJST**

Dagelijkse benodigdheden voor vleeskuikens van 0-35 dagen oud



Denk aan de 5 principes tijdens de opstartfase



Dag van uitkomst

- ✓ Volg de vijf principes tijdens de opstartfase van Cobb
- ✓ Standaard streefgewicht bij ongesekste vleeskuikens is 42 g
- ✓ 32-34 °C omgevingstemperatuur, afhankelijk van Relatieve Vochtigheid RH%, ouderdierleeftijd en cloacatemperatuur

7 dagen

- ✓ Streef naar een minimale groeiverhouding van x 4,6 het eendagskuikengewicht
- ✓ Standaard streefgewicht bij ongesekste vleeskuikens is 193 g
- ✓ 30 °C is de richtlijn voor omgevingstemperatuur

14 dagen

- ✓ Streef naar een minimale groeiratio van x 2,74 7 daagse gewicht
- ✓ Standaard streefgewicht bij ongesekste vleeskuikens is 528 g
- ✓ 27 °C is de richtlijn voor omgevingstemperatuur

21 dagen

- ✓ Streef naar een minimale groeiratio van x 1,93 14 daagse gewicht
- ✓ Standaard streefgewicht bij ongesekste vleeskuikens is 1.018 g
- ✓ Richtlijn voor omgevingstemperatuur is 24 °C

28 dagen

- ✓ Streef naar een minimale groeiratio van x 1,59 21 daagse gewicht
- ✓ Standaard streefgewicht bij ongesekste vleeskuikens is 1.615 g
- ✓ Richtlijn voor omgevings-temperatuur is 21 °C

35 dagen

- ✓ Streef naar een minimale groeiratio van x 1,41 28 dagen gewicht
- ✓ Standaard als afraap gewicht van 2.273 g
- ✓ Richtlijn voor omgevings-temperatuur is 19 °C

Dagelijkse controles

- Zorg te allen tijde voor een goede bioveiligheid
- Inspecteer gedurende de dag alle stallen. Observeer het gedrag van de kuikens, controleer voer- / water- / ventilatieapparatuur, omgevingstemperatuur en luchtkwaliteit
- Verwijder dode dieren en selecteer daar waar nodig is
- Verlaag de omgevingstemperatuur dagelijks:
Dag 1-28: 0,4-0,5 °C per dag
Dag 29-35: 0,2-0,3 °C per dag
- Verhoog dagelijks de minimale ventilatie
- Pas de nippelhoogte aan: vleeskuikens moeten zich uitrekken om te drinken, maar moeten voeten horizontaal/vlak op de grond kunnen houden
- Pas de hoogte van het voer zo nodig aan, zodat er minder gemorst wordt
- Monitor strooiselvocht en handhaaf op 30-35%
- Koolstofdioxide in delen per miljoen
- Test alarmen en controleer dagelijks de instellingen van de controller
- Controleer voersilo's, zorg voor voldoende voer tot de volgende levering

Dagelijkse noteringen

- Sterfte en selectie: registreer dode (sterfte) en selectie (geëuthanaseerde) kippen per stal
- Registreer omgevingscondities: temperatuur (maximum & minimum) en relatieve vochtigheid
- Waterverbruik idealiter in ml / kip
- Verlichtingsprogramma, met vermelding van de donker periode (s)
- Minimum ventilatieprogramma
- Noteer vaccinaties / medicijnen in het logboek van het vleeskuikenbedrijf

Wekelijkse controles

- Verhoog de waterstroom door de nippel op elke drinklijn
- Weeg kippen elke week (1% op 3 verschillende plaatsen)
- Noteer het gemiddelde gewicht
- Test de generator minimaal 30 minuten
- Controleer of er voldoende voer op voorraad is
- Controleer of er voldoende brandstof op voorraad is